



CARDIOPRIMARIAFERROL.COM

## PRUEBAS FUNCIONALES EN CARDIOLOGÍA

- No es necesario mantener o canalizar una vía venosa periférica **sólo** para estas pruebas.
- En caso de canalizar una nueva vía venosa periférica, **evitar las flexuras de los brazos**.
- Anotar en la petición si el paciente se encuentra en algún tipo de aislamiento.
- Vestir **pijama** y no camisión, si es posible, en caso de Ergometría o Eco de estrés.

Prueba	Ayunas	CI	Recomendaciones
Prueba de esfuerzo (ergometría)	NO	SI	1. Medicación a tener en cuenta (anotar en la solicitud si se ha suspendido) <u>Prueba diagnóstica</u> : no deberá tomar 72h antes betabloqueantes (bisoprolol, carvedilol, nebivolol) ni calcioantagonistas (diltiazem, verapamilo). Evitar nitratos (uniket) las 48h previas y no aplicar parche de nitroglicerina las 12h previas. <u>Prueba pronóstica</u> : puede tomar su medicación habitual y poner parche NTG.
Ecocardiograma de esfuerzo (eco de estrés)	NO	SI	2. En las 3h previas, no se debe fumar ni tomar bebidas alcohólicas. 3. En las 24h previas no tomar té, café, refrescos de cola ni chocolate. 4. No realizar ejercicio físico intenso o ejercicio inhabitual en las 12h previas. 5. Utilizar zapato deportivo cerrado y ropa cómoda para facilitar el ejercicio. 6. En eco de estrés, no es posible realizar la prueba si el paciente tiene sonda vesical o sueroterapia.
Ecocardiograma de estrés farmacológico (eco dobutamina®)	SI	SI	- Seguir puntos 1-4 previos. - Comprobar que no tiene alergia a Dobutamina. - Vía venosa MSI.
Ecocardiograma transtorácico (ETT)	NO	NO	
Ecocardiograma transesofágico (ETE)	SI	SI	- Vía venosa MSD. - Retirar dentadura postiza si la tiene.
Ecocardiograma con burbujas	NO	NO	- Vía venosa MSI.
Ecocardiograma con contraste (Sonovue®)	NO	SI	- Comprobar que no tenga alergia a: hexafluoruro de azufre, macrogol 4000, distearoilfosfatidilcolina, dipalmitoilfosfatidilglicerol sódico o ácido palmítico.
Coronariografía (cateterismo cardíaco)	SI	SI	
Estudio electrofisiológico (EEF)	SI	SI	- Protocolo y check list en Intranet (camións clínicos)
ECG Holter	NO	NO	- Retirar a las 24h de su colocación. - Evitar cortar cables. - Avisar si el paciente tiene telemetría (en 5ª planta izquierda).
Test de Ajmalina® o de Flecainida®	SI	SI	- Comprobar que no tiene alergia a estos medicamentos. - Si prueba positiva: mantener en Observación las siguientes 4h. - Si prueba negativa: mantener en Observación las siguientes 2h.
Test de adenosina®	SI	SI	- Comprobar que no tiene alergia a este medicamento.

CI: consentimiento informado