

Región corporal	Signo	Patología cardiovascular asociada
Piel	Cianosis central	Cortocircuito derecha-izquierda cardiaco Metahemoglobinemia hereditaria
	Cianosis periférica o acrocianosis	Insuficiencia cardiaca con bajo gasto Arteriopatía periférica
	Cianosis diferencial (> en MMII que en MMSS)	Ductus arterioso persistente Hipertensión pulmonar con shunt dcha-izqda a nivel de grandes vasos
	Telangiectasias (arañas vasculares)	Sd. Osler-Weber-Rendu Esclerodermia
	Bronceado en zonas no expuestas	Sobrecarga de hierro, hemocromatosis
	Xantelasmas o xantomias	Alteración del metabolismo lipídico
	Ictericia	Hepatomegalia congestiva Cirrosis cardiaca Anemia hemolítica
	Flash facial	Síndrome carcinoide Feocromocitoma
Cabeza y cuello	Arco senil prematuro	Alteración del metabolismo lipídico
	Chapetas malares	Estenosis mitral Hipertensión pulmonar severa
	Exoftalmos pulsátil	Insuficiencia tricuspídea
	Ptosis u oftalmoplejía	Distrofia muscular
	Macroglosia	Amiloidosis

	Signo de Musset (asentimiento)	Insuficiencia aórtica
	Signo de Frank	Patología coronaria
Tórax	Cambios postquirúrgicos (esternotomía, toracotomía postero-lateral). Bolsa de MP o DAI	Cirugía cardíaca previa Implante de dispositivo intracardiaco
	Tórax infundibuliforme (pectus excavatum) Tórax en quilla (pectus carinatum)	Trastornos del tejido conectivo
	Colaterales venosas en pared anterior del tórax	Obstrucción de vena cava superior o subclavia
	Ginecomastia	Tratamiento previo con espironolactona
Extremidades	Acropaquias	Cardiopatías congénitas cianóticas Enfermedad pulmonar con hipoxia Endocarditis infecciosa
	Lesiones de Janeway	Endocarditis infecciosa
	Nódulos de Osler	
	Hemorragias en astilla	
	Edema bilateral en MMII	Sobrecarga de volumen (congestión izquierda) Insuficiencia venosa crónica Yatrogénico (calcioantagonistas dihidropiridínicos)
Signo de Quincke	Insuficiencia aórtica	