**Dolor de muelas
insoportable**

52 años

Tabaquismo activo

No AF de muerte súbita ni cardiopatía.

Sin tratamientos crónicos.

Valorado en Cardiología por alteración ECG coincidiendo con proceso febril (ver página siguiente). Está a la espera de realizar un Estudio Electrofisiológico para estratificación de riesgo arrítmico.

Ecocardiograma: normal.

Acude a Odontólogo por dolor muy intenso a nivel de primer molar (realizada endodoncia hace 7 años), con escasa respuesta a analgesia. Precisa extracción de molar.

¿Cuál te parece la actitud más correcta?

- 1.- Evitar intervención. Priorizar implante de DAI por riesgo arrítmico alto.
- 2.- Realizar intervención sin emplear lidocaína, podría propiciar arritmias ventriculares.
- 3.- Remitir al S. de Urgencias. Precisa monitorización para llevar a cabo la intervención.
- 4.- Llevar a cabo la intervención. No existe contraindicación para utilizar dosis bajas de lidocaína local.

¿Cuál te parece la actitud más correcta?

- 1.- Evitar intervención. Priorizar implante de DAI por riesgo arrítmico alto.
- 2.- Realizar intervención sin emplear lidocaína, podría propiciar arritmias ventriculares.
- 3.- Remitir al S. de Urgencias. Precisa monitorización para llevar a cabo la intervención.
- 4.- Llevar a cabo la intervención. No existe contraindicación para utilizar dosis bajas de lidocaína local.

¿Cuál te parece la actitud más correcta?

- 1.- Evitar intervención. Priorizar implante de DAI por riesgo arrítmico alto → ERROR. **Aunque tenemos el diagnóstico de S. Brugada tipo 1 (espontáneo o por fiebre), el paciente no presenta criterios de alto riesgo por los que se indicaría el implante de DAI de forma directa (MS abortada, TV sostenida, Síncope cardiogénico).**
- 2.- Realizar intervención sin emplear lidocaína, podría propiciar arritmias ventriculares. → ERROR. **El uso de lidocaína local como anestésico parece ser segura ya que su efecto es estrictamente local.**
- 3.- Remitir al S. de Urgencias. Precisa monitorización para llevar a cabo la intervención. → ERROR. **La intervención y el anestésico local no suponen un incremento de riesgo arrítmico del paciente, por lo que no precisa monitorización para ser llevada a cabo.**
- 4.- **Llevar a cabo la intervención. No existe contraindicación para utilizar dosis bajas de lidocaína local. VER RECOMENDACIONES PARA PACIENTE S. BRUGADA.**

Servicio de Cardiología
Hospital Universitario de Ferrol

RECOMENDACIONES SÍNDROME BRUGADA

Debido a la evidencia cardiológica y/o genética del Síndrome de Brugada, le aconsejamos que no debe tomar las siguientes medicaciones:

FÁRMACOS A EVITAR COMPLETAMENTE:

- **Antiarrítmicos:** Ajmalina, allapinina, ethacizina, flecainida, pilsicainida, procainamida, propafenona
- **Psicotrópicos:** Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Litio, Loxapina, Nortriptilina, Oxcarbamazepina, trifluoperazina
- **Anestésicos/analgésicos:** Bupivacaína, procaína, Propofol*
- **Otras sustancias:** Acetilcolina, alcohol (dosis tóxicas), cannabis, cocaína, ergonovina

* Se han observado eventos adversos relacionados con la infusión prolongada de propofol.

FÁRMACOS A EVITAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

- **Antiarrítmicos:** Amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaína*, propranolol, verapamilo, vernakalant.
- **Psicotrópicos:** Bupropion, Carbamazepina, Ciamemazina, Clotiapina, Dosulepina, Doxepina, Fluoxetina, fluvoxamina, Imipramina, lamotrigina, maprotilina, paroxetina, perfenazina, fenitoína, tiorinadazina.
- **Anestésicos/analgésicos:** Ketamina, Tramadol
- **Otras sustancias:** Demenidrinato, difenidramina, edrofonio, Indapamida, Metoclopramida, Terfenadina/Fexofenadina.

*El uso de lidocaína para la anestesia local parece ser segura siempre que se utilicen dosis bajas y si se combina con adrenalina (epinefrina) ya que se consigue un efecto estrictamente local.

SITUACIONES A TENER EN CUENTA

- **FIEBRE:** En caso de fiebre se recomienda reducir la temperatura corporal mediante el uso de antitérmicos (por ejemplo paracetamol) y, en determinadas situaciones, realizar una monitorización del ritmo cardíaco.
- **COMBINACIÓN DE FÁRMACOS:** Es importante recordar que muchas prescripciones contienen una combinación de fármacos activos.

Para obtener las recomendaciones más recientes, visite
<http://www.brugadadrugs.org/emergencias>