



RECOMENDACIONES SÍNDROME BRUGADA

Debido a la evidencia cardiológica y/o genética del Síndrome de Brugada, le aconsejamos que no debe tomar las siguientes medicaciones:

FÁRMACOS A EVITAR COMPLETAMENTE:

- **Antiarrítmicos**: Ajmalina, allapinina, ethacizina, flecainida, pilsicainida, procainamida, propafenona
- **Psicotrópicos**: Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Litio, Loxapina, Nortriptilina, Oxcarbamazepina, trifluoperazina
- **Anestésicos/analgésicos**: Bupivacaína, procaína, Propofol*
- **Otras sustancias**: Acetilcolina, alcohol (dosis tóxicas), cannabis, cocaína, ergonovina

*** Se han observado eventos adversos relacionados con la infusión prolongada de propofol.**

FÁRMACOS A EVITAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

- **Antiarrítmicos**: Amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaína*, propranolol, verapamilo, vernakalant.
- **Psicotrópicos**: Bupropion, Carbamazepina, Ciamemazina, Clotiapina, Dosulepina, Doxepina, Fluoxetina, fluvoxamina, Imipramina, lamotrigina, maprotilina, paroxetina, perfenazina, fenitoína, tiorinadazina.
- **Anestésicos/analgésicos**: Ketamina, Tramadol
- **Otras sustancias**: Demenidrinato, difenidramina, edrofonio, Indapamida, Metoclopramida, Terfenadina/Fexofenadina.

***El uso de lidocaína para la anestesia local parece ser segura siempre que se utilicen dosis bajas y si se combina con adrenalina (epinefrina) ya que se consigue un efecto estrictamente local.**

SITUACIONES A TENER EN CUENTA

- **FIEBRE**: En caso de fiebre se recomienda reducir la temperatura corporal mediante el uso de antitérmicos (por ejemplo paracetamol) y, en determinadas situaciones, realizar una monitorización del ritmo cardiaco.
- **COMBINACIÓN DE FÁRMACOS**: Es importante recordar que muchas prescripciones contienen una combinación de fármacos activos.

Para obtener las recomendaciones más recientes, visite
<http://www.brugadadrugs.org/emergencias>